

REGISTAR LEKOVA DOPUNA III

2012



NOVI LEKOVI

M05BA04	Aldron , Farmal (alendronska kiselina)	bisfosfonat
	tabl. 4 x 70mg	
	upotreba: lek obavezno uzimati 30 minuta pre doručka sa punom čašom vode i ostati u uspravnom položaju najmanje 30 minuta 1 x nedeljno po 70mg	
	paralele: Alefoss, Alendronat, Alendronat ICP, Bonap, Forosa, Fosamax, Sedron	
A02BC02	Apazol , Farmal (pantoprazol)	inhibitor protonske pumpe
	gastrorezistentna tabl. 28 x 20mg i 40mg	
	upotreba: primenjuje se najduže 8 nedelja neprekidno, i uzima se 30 minuta pre doručka	
	ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma), ili 4 nedelja (ulkus želuca)	
	refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje	
	paralele: Controloc, Gastroloc, Nolpaza, Panrazol, Pantoprazol, Pantoprazol Farmoz, Pantoprazol Sandoz, Pulcet, Zeladrol, Zoltex	
C10AA05	Atorvastatin PharmaS , PharmaS (atorvastatin)	hipolipemik
	film tabl. 30 x 10mg, 20mg i 40mg	
	upotreba: 10mg uveče, po potrebi dozu postepeno povećavati u intervalima od 4 nedelje do 40mg dnevno, Max. 80mg dnevno	
	paralele: Atacor, Atolip, Atoris, Dislipat, Hipolip, Lipidra, Sortis, Tulip	
B01AC24	Brilique , AstraZeneca UK Brilique , AstraZeneca Švedska (tikagrelor)	inhibitor agregacije trombocita
	film tabl. 56 x 90mg	
	upotreba: 180mg odjednom početno, zatim nastaviti 2 x 90mg	
N02BE51 (BR)	Caffetin COLDmax , Alkaloid (paracetamol + fenilefrin)	terapija nazeba
	prašak za oralni rastvor 10 x (1000mg + 10mg) 5,15g	
	upotreba: 1 do Max. 4 prašaka dnevno, rastvoren u vodi, razmak između doza ne sme biti manji od 4 sata	

N06AB10	Citram , Belupo (escitalopram)	antidepresiv
	film tabl. 28 x 10mg	
	upotreba: tablete se mogu deliti, uzima se u pojedinačnoj dnevnoj dozi, nezavisno od hrane depresija, anksiozni poremećaji (socijalni i generalizovani), opsesivno kompulzivni poremećaj: 1 x 10mg, po potrebi povećati do Max. 20mg dnevno panični poremećaji sa agorafbijom ili bez nje: 5mg (početna doza) tokom 7 dana, zatim 10mg dnevno, Max. 20mg dnevno	
	paralele: Cipralex, Elicea, Esram, Lata	
R01BA53 (BR)	Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom, SmithKline Beecham Španija (paracetamol + fenilefrin hlorid + askorbinska kiselina)	terapija nazeba
	prašak za oralni rastvor 5 x (1000mg + 10mg + 70mg)/7,6g	
	upotreba: lek se primenjuje najduže 7 dana odrasli i deca iznad 12 godina: 1 prašak na 4 - 6 sati, rastvoren u vodi, Max. 4 praška dnevno, razmak između doza ne sme biti kraći od 4 sata	
	paralele: Coldrex HotRem, Influrex	
N02BE01 (BR)	Coldrex Menthol Active , SmithKline Beecham Španija (paracetamol)	analgoantipiretik
	prašak za oralni rastvor 5 i 10 x 500mg	
	upotreba: lek ne treba primenjivati duže od 3 dana u kontinuitetu odrasli i deca iznad 12 godina: 500 - 1000mg na 4 - 6 sati, Max. 4g dnevno, razmak između doza ne sme biti kraći od 4 sata	
	paralele: Efferalgan, Febricet, Panadol, Panadol Advance, Panadol Baby, Paracetamol, Paracetamol PharmaSwiss, Paracetamol Sopharma, Perfalgan	
G03XC02	Conbriza , Pfizer Irska (bazedoksifen)	terapija osteoporoze
	film tabl. 28 x 20mg	
	upotreba: 1 x 20mg nezavisno od jela	
C01AA05	Digoxicor , Sopharma (digoksin)	kardiotonik
	tabl. 50 x 0,25mg	
	upotreba: 0,75 - 1,5mg (10 - 15µg/kg) dnevno, u podeljenim dozama (brza digitalizacija), 0,125 - 0,5mg (5µg/kg) dnevno, u podeljenim dozama (doza održavanja)	
	paralele: Dilacor	

L01CD02 (SZ)

Docetaxel HF, Cell Pharm

(docetaksel)

citostatik - antimitotik

konzentrat i rastvarač za rastvor za inf. 1 x 20mg/0,5ml i 80mg/2ml

upotreba: 100mg/m² u vidu jednočasovne infuzije, svake 3 nedelje

paralele: Docetaxel, Docetaxel Sandoz, Taxotere

J06BA02 (SZ)

Flebogamma DIF, Instituto Grifols

(humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu)

imunoglobulin

Flebogamma 5% DIF rastvor za inf. 1x (50mg/ml) 10ml, 50ml, 100ml, 200ml i 400ml

Flebogamma 10% DIF rastvor za inf. 1x (100mg/ml) 50ml, 100ml i 200ml

upotreba: doziranje je individualno, preporučena početna dnevna doza

0,4 - 0,8g/kg, zatim 0,2g/kg mesečno u podeljenim dozama svake 3 - 4 nedelje

paralele: Intratect, Kiovig, Privigen, Vigam Liquid

J01CF05 (Z)

Flucloxacillin Eurobindo, Eurobindo

penicilin

(flukloksacilin)

prašak za rastvor za im iv inj./inf. 1 x 1000mg

upotreba: lek se primenjuje intramuskularnom, intravenskom, intraartikularnom ili

intrapleuralnom injekcijom, infuzijom ili inhalacijom preko

raspršivača/nebulizatora

odrasli - im primena: 250mg na 6 sati (250mg leka rastvara se sa 1,5ml a 500mg sa 2ml vode za inj.)

- iv primena: 250mg - 1g na 6 sati, kod težih infekcija doze se mogu duplirati a za endokarditis i osteomijelitis preporučeno 8g dnevno (250 - 500mg leka rastvara se sa 5 - 10ml a 1g sa 15 - 20ml vode za inj. i tako pripremljeno može se dodati infuzionom rastvoru)

- intra-pleuralno: 250mg dnevno (250mg leka rastvara se sa 5 - 10ml vode za inj.)

- intra-artikularno: 250 - 500mg dnevno (250 - 500mg leka rastvara se sa 5ml vode za inj. ili 0,5% rastvora lidokain hlorida)

- inhalaciono: 125 - 250mg na 6 sati (125 - 250mg sa 3ml vode za inj.)

deca ispod 2 godine: 1/4 doze za odrasle

2 - 10 godina: 1/2 doze za odrasle

S01ED51

Ganfort, Allergan

terapija glaukoma

(timolol maleat + bimatoprost)

kapi za oči, rastvor (5mg + 300µg)/ml 3ml

upotreba: 1 kap ujutro, u obolelo oko

L04AA27 (SZR)

Gilenya, Novartis Pharma Stein Švajcarska

selektivni

(fingolimod)

imunosupresiv

kaps. tvrda 28 x 0,5mg

upotreba: lek se uzima nezavisno od hrane
preporučena doza: 1 x 0,5mg

A10BB09	Gliklazid MR , Zdravlje (gliklazid)	oralni antidiabetik
	tabl. sa modifikovanim oslobođanjem 30 x 30mg	
	upotreba: 30 - 120mg ujutro uz doručak u jednoj dozi	
	paralele: Diaprel MR, Diprian, Gliclada, Glikosan, Glorinal	
A10BB12	Glimegamma , Worwag Pharma (glimepirid)	oralni antidiabetik
	tabl. 30 x 2mg i 3mg	
	tabl. 30 i 60 x 4mg i 6mg	
	upotreba: lek se uzima pre ili u toku doručka	
	1mg dnevno po potrebi povećavati u intervalu 1 - 2 nedelje po 1mg do Max. 6mg dnevno	
	paralele: Amaryl, Dibiglim, Glimepirid, Limeral, Meglimid, Trical	
A04AA02	Granisetron Sandoz , Salutas Pharma (granisetron)	antiemetik uz hemio i radioterapiju
	film tabl. 5 i 10 x 1mg i 2mg	
	upotreba:	
	uz hemoterapiju - odrasli: 1 - 2mg na 1 sat pre hemoterapije ili 1mg na 12 sati (oralno)	
	ili 3mg neposredno pre hemoterapije sporo iv ili infuzijom tokom 5 minuta	
	- deca: 20µg/kg podeljeno u 2 dnevne doze, Max. 1mg dnevno	
	postoperativna mučina - odrasli: 1mg sporo iv neposredno pre anestezije	
	paralele: Granisetron Teva, Kytril, Rasetron	
G01Af15	Gynofort , Gedeon Richter (butokonazol nitrat)	antimikotik
	vaginalni krem u jednodoznom aplikatoru 1 x (20mg/g) 5g	
	upotreba: žene iznad 18 godina: 1 x dnevno, najbolje uveče pred spavanje	
J07AG01 (Z)	Hiberix , GlaxoSmithKline Belgija (vakcina protiv Haemophilus influenzae tip b (Hib))	vakcina protiv H.influence tip B
	prašak i rastvarač za rastvor za inj. sc im 1 i 100 x 10µg/0,5ml	
	upotreba: rekonstituisana vakcina se primenjuje odmah, bez odlaganja	
	primarna imunizacija - deca 6 - 12 meseci: 2 doze vakcine sa intervalom od mesec dana, buster doza tokom 2 godine života	
	1 - 5 godina: 1 doza vakcine, buster doza nije neophodna	

J01FA09

Klaritromicin, PharmaS

(klaritromicin)

makrolidni antibiotik

film tabl. 14 x 250mg i 500mg

upotreba:

odrasli i deca iznad 12 godina: 250mg na 12 sati, tokom 7 dana ili 500mg na 12 sati, do 14 dana (teške infekcije)

paralele: Clarexid, Fromilid, Fromilid uno, Klacid, Klacid IV, Klacid MR, Klerimed, Lekoklar, Lekoklar XL, Zymbaktar

J01DH02 (SZ)

Meropenem Providens, Pharmathen

(meropenem)

antibiotik -

karbopenem

pršak za rastvor za iv inj./inf. 10 x 500mg i 1g

upotreba: odrasli - uobičajeno: 500mg - 1g na 8 sati

- meningitis i cistična fibroza: 2g na 8 sati

deca 3 meseca - 12 godina, ispod 50kg: 10 - 20mg/kg na 8 sati
iznad 50kg: 500mg na 8 sati

4 - 18 godina (cistična fibroza): 25 - 40mg/kg na 8 sati

4 - 18 godina (meningitis): 40mg/kg na 8 sati

paralele: Itanem, Merocid, Meronem, Meropenem Pharmanova

N04BC04

Nypero, Alkaloid

(ropinirol)

antiparkinsonik

film tabl. 21 x 0,25mg, 0,5mg, 1mg, 2mg i 5mg

upotreba: 0,75mg dnevno podeljeno u 3 doze (početno), povećavati po 0,75mg nedeljno do doze od 3mg dnevno, dalje povećavati po 3mg nedeljno do zadovoljavajućeg odgovora

uobičajena doza: 3 - 9mg dnevno podeljeno u 3 doze, Max. 24mg dnevno

paralele: Eminens, ReQuip, ReQuip Modutab, Repirol

N05AH03

Olanzapin PharmaS, PharmaS

▲ (olanzapin)

antipsihotik

oralna disperzibilna tabl. 28 x 5mg i 10mg

upotreba: oralna disperzibilna tabl. se stavlja direktno na jezik ili se prethodno rastvori u malo vode, soka, mleka ili kafe

odrasli: 1 x 10mg (početna doza), zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili povećati do Max. 20mg

paralele: OlanzEP, Olanzapin Sandoz, Olanzapin-Teva, Onzapin, Sizap, Treana, Vaira-V, Zalasta, Zapilex, Zyprexa Velotab

A10BH03	Onglyza , Bristol Myers Squibb (saksagliptin)	oralni antidiabetik
	film tabl. 28 x 5mg upotreba: odrasli iznad 18 godina - u kombinaciji sa metforminom ili sulfonilureom ili tiazolidindionom: 1 x 5mg	
S01EC03	Optodrop , Rafarm (dorzolamid)	terapija glaukoma
	kapi za oči, rastvor (20mg/ml) 5ml upotreba: 1 kap u obolelo oko, na 8 sati (monoterapija) ili na 12 sati (uz beta blokator) paralele: Dorzolamid Teva, Trusopt, Ulom	
J07BF02 (Z)	Opvero , Sanofi Pasteur (vakcina protiv dečje paralize (oralna))	vakcina protiv dečje paralize
	oralna suspenzija 10 x 0,1ml	
N06AB05	Paroksetin PharmaS , PharmaS Δ (paroksetin)	antidepresiv
	film tabl. 30 x 20mg i 30mg upotreba: depresija, socijalna fobija, generalizovani anksiozni poremećaj, posttraumatski stresni poremećaj: 20mg dnevno, po potrebi povećavati za 10mg dnevno do Max. 50mg dnevno opsesivno kompulzivne bolesti, panični poremećaji: 40mg do Max. 60mg dnevno paralele: Actapax, Arketis, Paroksetin, Paroxetin Sandoz, Rexetin, Seroxat	
G03GA06 (SZR)	Puregon , Organon Irska (folitropin beta-rekombinantri humani FSH)	hormon
	rastvor za inj. (u ulošku) sc 1 x 300ij/0,36ml, 600ij/0,72ml i 900ij/1,08ml upotreba: doziranje je individualno, zavisno od kliničkog odgovora	
N04BC04	Repirol , PharmaSwiss (ropinirol)	antiparkinsonik
	tabl. sa produženim oslobođanjem 30 x 2mg, 4mg i 8mg upotreba: 1 tabl. dnevno, Max. 24mg dnevno paralele: Eminens, Nypero, ReQuip, ReQuip Modutab	

B05BB01 (Z) **Ringer's injection**, B. Braun nadoknada tečnosti i elektrolita
(natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid)

rastvor za inf. 10 x (8,6g + 0,3g + 0,33g)/L 500ml i 1000ml

upotreba: 0,5 - 1L dnevno

paralele: Natrii chloridi infundibile compositum, Ringerov rastvor

N05AX08 **Risperidon**, Replek Farm
▲ (*risperidon*) antipsihotik

film tabl. 20 x 2mg

upotreba: uobičajeno doziranje: 2 x 2 - 4mg, Max. 2 x 8mg

paralele: Rispen, Rispolept, Rispolept Consta, Rispolux, Rissar, Risset, Speridan,

Torendo, Torendo Q-TAB

C10AA07 **Rovesta**, Pharmanova
(*rosuvastatin*) hipolipemik

film tabl. 28 x 10mg, 20mg i 40mg

upotreba: 1 x 5 - 10mg (početno), po potrebi povećavati u intervalima, ne kraćim, od 4 nedelje do 1 x 20mg, izuzetno kod visokog kardiovaskularnog rizika pod nadzorom specijaliste povećavati na 1 x 40mg

paralele: Crestor, Rosuhol, Roxera

N01BB58 (Z) **Septanest adrenalin 1/100000**, Septodont lokalni
(artikain hlorid + epinefrin bitartarat) anestetik u stomatologiji

rastvor za inj. (uložak) 50 x (40mg + 0,01mg)/ml 1,7ml

upotreba: uobičajena doza: 1,7ml po zubu

B01AC04 **Synetra**, Alkaloid inhibitor agregacije trombocita
(*klopidogrel*)

film tabl. 30 x 75mg

upotreba: prevencija ateroskleroze: 75mg dnevno

akutni koronarni sindrom, akutni infarkt miokarda: 300mg inicijalno, nastaviti sa 75mg dnevno sa aspirinom

paralele: Antiagrex, Cardogrel, Clopidix, Clopidogrel Farmoz, Clopigal, Klogrel, Klopidoagrel, Monogrel, Plavix, Zyllt

C09CA07 **Tolura**, Krka antihipertenziv
Tolura, Krka Polska
(*telmisartan*)

tabl. 28 x 40mg i 80mg

upotreba: 40mg dnevno, Max. 1 x 80mg

paralele: Micardis

C09AA10

Trandolapril PharmaS, PharmaS

ACE inhibitor

(trandolapril)

kaps. tvrda 28 x 0,5mg, 2mg i 4mg

upotreba:

odrasli: 1 x 0,5mg početno, povećavati u intervalu 2 - 4 nedelje do

Max. pojedinačne dnevne doze od 4mg,

uobičajena doza održavanja 1 x 1 - 2mg dnevno

C09DB04

Twynsta, Boehringer Ingelheim Nemačka

antihipertenziv

(telmisartan + amlodipin)

tabl. 28 x (80mg + 5mg)

tabl. 28 x (80mg + 10mg)

upotreba: 1 tabl. dnevno, Max. (80mg + 10mg)

G04BX.. (BR)

Uro-Vaxom, OM Pharma

prevencija urinarnih infekcija

(liofilizovani bakterijski lizat E. coli)

kaps. tvrda 30 x 6mg

upotreba: 1 kaps. dnevno tokom 3 meseca

N05AH03

Vaira-V, Belupo

antipsihotik

▲ (olanzapin)

oralna disperzibilna tabl. 28 x 5mg i 10mg

upotreba: oralna disperzibilna tabl. se stavlja direktno na jezik ili se prethodno rastvori u malo vode, soka, mleka ili kafe

odrasli: 1 x 10mg (početna doza), zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili povećati do Max. 20mg

paralele: OlanzEP, Olanzapin PharmaS, Olanzapin Sandoz, Olanzapin-Teva, Onzapin, Sizap, Treana, Zalasta, Zapilex, Zyprexa Velotab

C09CA03

Val, Belupo

antihipertenziv

(valsartan)

film tabl. 28 x 80mg i 160mg

upotreba:

hipertenzija: 1 x 80mg (početno), po potrebi posle 4 nedelje povećati na 160mg dnevno srčana insuficijencija: 2 x 40mg, po potrebi 2 x 80mg, Max. 2 x 160mg

postinfarktno stanje: 2 x 20mg 12 sati posle infarkta, dozu postepeno povećavati do 2 x 160mg dnevno

paralele: Diovan, Tenival, Valsacor, Valsartan Sandoz

HD06BB. **Veregen**, Pharmanova biljni lek za terapiju genitalnih bradavica
(zeleni čaj (*Camellia sinensis*), suvi ekstrakt lista)

mast (10%) 15g

upotreba:

odrasli iznad 18 godina: 3 x dnevno mazati spoljašnje genitalne i perianalne bradavice,
najduže 16 nedelja

C02KX02 (SZR) **Volbris**, Aspen Bad Oldesloe terapija plućne
(ambrisentan) arterijske hipertenzije

film tabl. 30 x 5mg i 10mg

upotreba: 1 x 5mg

J01XX08 **(linezolid)** antibiotik – oksazolidinon

(SZ) **Zyvox**, Fresenius Kabi rastvor za inf. 10 x (2mg/ml) 300ml

(SZR) **Zyvox**, Pfizer Portoriko film tabl. 30 x 600mg

upotreba:

oralno: 600mg na 12 sati, tokom 10 - 14 dana, Max. do 28 dana
parenteralno - odasli i deca iznad 12 godina: 600mg (tokom 30 - 120 minuta) na 12 sati
- deca do 12 godina (izuzetno): 10mg/kg na 8 sati

paralele: Zenix

NOVI OBLIK, DOZA, PAKOVANJE ILI IME LEKA

Panadol Advance, S.C. Europharm **NOVO IME** za
Panadol Rapid, S.C. Europharm

C08CA01	Amlodipine PharmaSwiss , PharmaSwiss (<i>amlodipin</i>)	<i>antagonist Ca2+</i>
	tabl. 20 i 30 x 5mg i 10mg	NOVO PAKOVANJE
D11AX.. (BR)	Contractubex , Merz Pharma (<i>heparin natrijum + alantoin + tečni ekstrakt crnog luka</i>)	<i>terapija ozljedaka</i>
	gel (5000ij + 1g + 10g)/100g 20g i 50g	NOVO PAKOVANJE
A02BC01	Esomeprazol PharmaS , PharmaS (<i>esomeprazol</i>)	<i>inhibitor protonskih pumpa</i>
	gastrorezistentna tabl. 7, 10, 14 i 30 x 20mg i 40mg	NOVO PAKOVANJE
L01BC05 (SZ)	Gemcitabin PharmaSwiss , PharmaSwiss Δ (<i>gemcitabin hlorid</i>)	<i>citostatik - antimetabolit, analog pirimidina</i>
	prašak za rastvor za inf. 1 i 10 x 200mg, 1g i 2g	NOVO PAKOVANJE
H01AC01	Genotropin , Pfizer Belgium (<i>somatotropin humani rekombinantni</i>)	<i>hormon rasta</i>
	prašak i rastvarač za rastvor za inj. (uložak) sc im 1 i 5 x 5,3mg/1ml i 12mg/1ml prašak i rastvarač za rastvor za inj. (pen sa uloškom) sc im 1 i 5 x 5,3mg/1ml i 12mg/1ml	NOVO PAKOVANJE
A10BA02	Glucophage , Merck Španija (<i>metformin hlorid</i>)	<i>oralni antidiabetik</i>
	film tabl. 50 x 500mg film tabl. 30 x 1000mg	NOVI OBLIK
	prašak za oralni rastvor 30 x 500mg, 850mg i 1000mg	

J01FA10	Hemomycin , Hemofarm (azitromicin)	makrolidni antibiotik
	kaps. tvrda 6 x 250mg film tabl. 3 x 500mg prašak za oralnu suspenziju (100mg/5ml) 20ml i (200mg/5ml) 30ml NOVA DOZA prašak za rastvor za inf. 1 x 500mg upotreba: lek se uzima pre jela odrasli i deca iznad 45kg: 500mg dnevno tokom 3 dana ili 1 x 500mg prvi dan, zatim 1 x 250mg naredna 4 dana deca: 100mg dnevno tokom 3 dana (10 – 14kg) 200mg dnevno tokom 3 dana (15 – 25kg) 300mg dnevno tokom 3 dana (26 – 35kg) 400mg dnevno tokom 3 dana (36 – 45kg) parenteralno: 500mg dnevno infuzijom paralele: Azax, Azibiot, Azitrim, Azitromicin Sandoz, Sumamed, Zmax	
M01AE01	Ibalgin 400 , Zentiva (ibuprofen)	nesteroidni antireumatik
	film tabl. 10 i 12 x 400mg	NOVO PAKOVANJE
C09AA03	Irumed , Belupo (lisinopril)	ACE inhibitor
	tabl. 30 x 5mg i 20mg	NOVO PAKOVANJE
G04BE09	Levitra , Bayer Schering Pharma Nemačka (vardenafil)	terapija erektilne disfunkcije
	film tabl. 4 x 5mg film tabl. 2 i 4 x 10mg i 20mg oralna disperzibilna tabl. 1, 2, i 4 x 10mg	NOVI OBLIK
M01AC06	Meloxan , Pharmanova (meloksičam)	nesteroidni antireumatik
	tabl. 20 i 30 x 15mg	NOVO PAKOVANJE
A03AX58	Meteospasmyl , Laboratoires Mavoly Spindler (alverin citrat + simetikon)	terapija sindroma nadraženih creva
	kaps. meka 20 i 30 x (60mg + 300mg)	NOVO PAKOVANJE
R03DC03	Montelukast PharmaS , PharmaS (montelukast)	antiasmatik
	tabl. za žvakanje 28 x 5mg tabl. 28 x 10mg	NOVI OBLIK I DOZA

M03AC03 (SZ)	Norcuron , Organon Holandija (vekuronijum bromid)	miorelaksans
	prašak i rastvarač za rastvor za inj. iv inf 10 x 4mg/ml	NOVO PAKOVANJE
B02BD08 (SZR)	NovoSeven , Novo Nordisk (aktivirani eptakog alfa faktor VIIa – humani rekombinantni))	hemostatik
	prašak i rastvarač za rastvor za inj. iv 1 x 1mg/1,1ml, 1,2mg/2,2ml, 2mg/2,1ml , 2,4mg/4,3ml i 5mg/5,2ml	NOVA DOZA
	upotreba: 1,2mg = 60kij, rastvarač je voda za inj.	
	Doze i dužina terapije određuju se individualno; primenjuje se isključivo iv injekcijom; ne sme se mešati sa infuzionim rastvorima	
	teške epizode krvarenja: 3 – 6kij/kg (60 – 120µg)/kg, na 2 – 3 sata u početku, zatim u intervalima 4 – 12 sati	
L01XA03 (SZ)	Oxaliplatin PharmaSwiss , PharmaSwiss (oksaliplatin)	citostatik - alkilirajući agens
	prašak za rastvor za inf. 1 i 10 x 50mg i 100mg	NOVO PAKOVANJE
M01AX05 (BR)	Perigona , Chephasaar (glukozamin sulfat)	terapija artritisa
	film tabl. 20, 30 i 100 x 500mg	NOVO PAKOVANJE
HN05CM. (BR)	Persen forte , Lek (suvi ekstrakti: korena valerijane+lista matičnjaka+lista nane)	biljni anksiolitik
	kaps. tvrda 10 i 20 x (125mg + 25mg + 25mg)	NOVO PAKOVANJE
D11AX01 (BR)	Pilfud , Bosnalijek (minoksidil)	terapija alopecije
	rastvor za kožu (2%) 60ml sprej za kožu, rastvor (5%) 60ml	NOVI OBLIK
B01AE07 (SZR)	Pradaxa , Boehringer Ingelheim Nemačka (dabigatraneteksilat)	oralni antikoagulans (direktni inhibitor trombina)
	kaps. tvrda 10 i 30 x 75mg	
	kaps. tvrda 30 x 110mg	
	kaps. tvrda 60 x 150mg	NOVA DOZA
	upotreba: prevencija moždanog udara i sistemske embolije kod odraslih sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom: 2 x 150mg (uobičajeno), 2 x 110mg (iznad 80god.) prevencija venske tromboembolije: 110mg 1 – 4 sata posle hirurške intervencije, zatim 1 x dnevno 220mg (tokom 10 dana posle zamene kolena) ili (tokom 28 – 35 dana posle zamene kuka) uobičajeno: 2 x 150mg dugoročno	

G03GA06	Puregon , Organon Holandija (folitropin beta-rekombinantni humani FSH)	hormon
	(Rp) rastvor za inj. sc im 1 x (50ij/0,5ml) 5ml i (100ij/0,5ml) 5ml (SZR) rastvor za inj. (u ulošku) sc 1 x 300ij/0,36ml, 600ij/0,72ml i 900ij/1,08ml	
NOVI OBLIK I DOZA		
	upotreba: doziranje je individualno, zavisno od kliničkog odgovora	
L03AB07 (SZR)	Rebif , Merck Serono (interferon beta 1a – humani rekombinantni)	terapija multiple skleroze
	rastvor za inj. (špric) sc 12 x 22mcg/0,5ml i 44mcg/0,5ml rastvor za inj. (uložak) sc 4 x (22mcg/0,5ml) 1,5ml i (44mcg/0,5ml) 1,5ml	NOVI OBLIK
A01AD02 (BR)	Tantum , A.C.R.A.F. (benzidamin hlorid)	antiinflamatorno sredstvo
	rastvor za ispiranje usta (1,5mg/ml) 120ml, 150ml i 240ml NOVO PAKOVANJE	
L01XE08 (SZ)	Tasigna , Novartis Pharma Stein Švajcarska (nilotinib)	citostatik - inhibitor protein kinaze
	kaps. tvrda 112 x 150 i 200mg upotreba: lek se uzima isključivo na prazan stomak odrasli iznad 18 godina: 2 x 300mg dok je doza delotvorna ili dok se ne pojave znaci toksičnosti, tada preći na dozu 1 x 400mg	NOVA DOZA
N05AX08	Torendo , Krka ▲ (risperidon)	antipsihotik
	film tabl. 20 i 30 x 1mg film tabl. 30 x 2mg i 30 x 3mg film tabl. 20 x 4mg	NOVA DOZA
G04BD08	Vesicare , Astellas (solifenacin sukcinat)	terapija inkontinencije
	film tabl. 10 i 30 x 5mg film tabl. 30 x 10mg	NOVO PAKOVANJE
R06AE09	Xyzal , UCB Pharma Italija (levocetirizin)	antihistaminik
	film tabl. 10 i 30 x 5mg oralni rastvor (0,5mg/ml) 75ml i 200ml upotreba: lek se uzima nezavisno od jela odrasli i deca iznad 6 godina: 1 x 5mg deca 2 - 6 godina: 2 x 1,25mg (2,5ml) paralele: Cezera	NOVI OBLIK I DOZA

OBNOVLJENA REGISTRACIJA LEKA

S01FA01

Atropin, Hemofarm
(*atropin sulfat*)

midrijatik

kapi za oči, rastvor (5mg/ml) 10ml i (10mg/ml) 10ml

upotreba:

odrasli - uveitis: 2 - 3 x 1 kap (rastvora od 10mg/ml)

- određivanje refrakcije: 2 x 1 kap (rastvora od 10mg/ml)

deca 3 meseca - 18 godna (cikloplegija): 2 x 1 kap (rastvora od 5mg/ml), tokom
3 dana pre intervencije

2 - 18 godna (uveitis): 4 x 1 kap (rastvora od 5mg/ml)

J01DE01

Cefim, Hemofarm
(*cefepim*)

cefalosporin

prašak za rastvor za im inj./inf. 1 x 500mg i 1g

upotreba:

odrasli i deca iznad 12 godina – uobičajeno: 1 – 2g na 12 sati tokom 7 – 10 dana

nekomplikovane urinarme infekcije: 500mg na 12 sati

paralele: Maxicef

J01AA02

Doksiciklin, Hemofarm
(*doksiciklin*)

tetraciklin

kaps. tvrda 5 x 100mg

upotreba: lek se uzima posle jela

odrasli: 2 x 100mg (prvi dan), zatim 100mg dnevno

paralele: Dovicin, Vibramycin D

N01BB52 (Z)

Lidokain 2% adrenalin, Galenika
(*lidokain hlorid + epinefrin hlorid*)

lokalni anestetik u
stomatologiji

rastvor za inj. 50 x (40mg + 0,025mg)/2ml

upotreba: doziranje zavisi od vrste anestezije (infiltracija ili blokada nerava),
uobičajeno 1 – 5ml, Max. 20mlodrasli i deca iznad 12 godina: potrebno je dati najmanju dozu kojom se postiže željeni
efekat, Max. pojedinačna doza lidokaina u kombinaciji sa
adrenalinom je 7mg/kg ili ukupno 500mg

R05CB03 (BR)

Mucodyne, Hemofarm
(*karbocistein*)

mukolitik

kaps. tvrda 30 x 375mg

sirup (50mg/ml) 100ml

sirup (za decu) (25mg/ml) 100ml

upotreba:

odrasli: 3 x 750mg (početna doza), zatim 2 x 750mg (doza održavanja)

deca: 4 x 62,5 – 125mg (2 – 5 godina), 3 x 250mg (5 – 12 godina)

paralele: Bronchobos

NOVI PROIZVOĐAČ ILI PROMENA PRIZVOĐAČA

C07AB07

Bilokord, Zdravlje
(bisoprolol)

beta blokator

tabl. 30 x 5mg i 10mg

upotreba: 5 – 10mg dnevno

paralele: Biprez, Biprol, Bisobel, Bisoprolol, Byol, Concor Cor, Tensec

PROMENA PROIZVOĐAČA

J01DC10

Cefzil, Corden Pharma
(cefprozil)

cefalosporin

film tabl. 10 x 500mg

prašak za oralnu suspenziju (250mg/5ml) 60ml

upotreba: terapija uobičajeno traje 10 dana

odrasli: 500mg na 24 sata (uobičajeno), 500mg na 12 sati (akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa)

deca 6 meseci – 12 godina: 20mg/kg dnevno (uobičajeno), 7,5 – 15mg/kg na 12 sati (otitis medija)

PROMENA PROIZVOĐAČA

A10BB09

Diaprel MR, Servier Ireland
(gliklazid)

oralni antidijabetik

tabl. sa modifikovanim oslobođanjem 30 i 60 x 60mg

NOVI PROIZVOĐAČ

upotreba: 30 – 120mg ujutro uz doručak u jednoj dozi

paralele: Diprian, Gliclada, Gliklazid MR, Glikosan, Glioral

D05AX05

Zorac, Pierre Fabre
(tazaroten)

terapija psorijaze

gel (0,05%) 15g

PROMENA PROIZVOĐAČA

gel (0,1%) 15g

upotreba: samo odrasli: gel nanositi isključivo na obolelo mesto uveče, ne sme se primeniti na više od 10% površine tela, terapija traje 12 nedelja

UKINUTA REGISTRACIJA LEKA

Actrapid Novolet, Novo Nordisk

Aspirin direct, Bayer Bitterfeld

Aspirin Migran, Bayer Bitterfeld

Ben Gay, Pfizer Turska

Ben Gay Sport Balm, Pfizer Turska

Emselex, Novartis Pharma Stein Švajcarska

Esmeron, Organon Irska

Insulatard Novolet, Novo Nordisk

Mixtard 30 NovoLet, Novo Nordisk

Runac, Jugoremedija

Rupurut, Catalent Nemačka

Solcoseryl, Alkaloid

Vancotex, Pharmatex

UKINUTA JAČINA, OBLIK IЛИ PAKOVANJE LEKA

A02AD01 (BR)	Altacid , Bosnalijek (aluminijum hidroksid + magnezijum hidroksid) tabl. za žvakanje 16 x (333,35mg + 158,4mg)	antacid
D01AC01 (BR)	Canesten , Bayer HealthCare (klotrimazol) prašak za kožu (1%) 30gr	antimikotik
C07AG02	Carvedigamma , Worwag Pharma (karvedilol) film tabl. 30 i 100 x 6,25mg film tabl. 50 x 12,5mg i 25mg	beta blokator
N03AX12	Gabagamma 400 , Worwag Pharma Δ (gabapentin) kaps. tvrda 20 i 50 x 400mg	antiepileptik
N03AX09	Lamictal , GlaxoSmithKline Poljska ▲ (lamotrigin) tabl. za oralnu suspenziju 30 x 2mg	antiepileptik
A10BA02	Metfogamma , Worwag Pharma (metformin hlorid) film tabl. 120 x 500mg, 850mg i 1000mg	oralni antidiabetik
C02AC05	Moxogamma , Worwag Pharma Δ (moksonidin) Moxogamma 0,2 film tabl. 50 x 0,2mg Moxogamma 0,3 film tabl. 50 x 0,3mg Moxogamma 0,4 film tabl. 50 x 0,4mg	antihipertenziv
J01CA04	Ospamox DT , Sandoz Austrija (amoksicilin) tabl. za oralnu suspenziju 10 x 500mg, 750mg i 1000mg tabl. za oralnu suspenziju 14 x 750mg	penicilin

A01AB11 (BR)

Septolete plus mentol, Krka

antiseptik za grlo

(*cetilpiridinijum hlorid + benzokain*)

komprimovana lozenga **30 x (1mg + 5mg)**

J07BB02 (Z)

Vaxigrip, Sanofi Pasteur

vakcina protiv gripa

(*vakcina protiv gripa (fragmentisani virus, inaktivisana)*)

suspensija za inj. (**ampula**) **sc im 20 x 0,5ml**

ISPRAVKA IMENA LEKA

umesto **Intergilin**, Glaxo Operations

treba da bude **Integrilin**, Glaxo Operations

PROMENA REŽIMA IZDAVANJA I NOVA INDIKACIJA

Pegltron, Schering-Plough Labo,

umesto režima izdavanja **SZ** sada ima režim **SZR**.

Za lek **Pegltron**, Schering-Plough Labo, odobrena je upotreba za decu od 3 godine i
stariju kao i adolescenata za lečenje
hroničnog hepatitisa C.